

Нормальный состав микробиоты кишечника

Микроорганизм	Дети до 1 года жизни		Дети старше года и взрослые
	на естественном вскармливании	на искусственном вскармливании	
Патогенные микроорганизмы	0	0	0
Кишечные палочки полноценные, биохимически активные	$10^7 - 10^8$	$10^7 - 10^8$	$10^7 - 10^8$
Кишечные палочки со слабо выраженными ферментативными свойствами	0	До 10%	До 10%
Кишечные палочки лактозонегативные	0	До 5%	До 5%
Кишечные палочки гемолизирующие	0	0	0
Условно-патогенные энтеробактерии	до 10^4	до 10^4	до 10^4
Микробы рода Протей	0	до 10^3	$10^3 - 10^4$
Синегнойная палочка	0	0	$10^3 - 10^5$
Стафилококк сапрофитный и эпидермальный	до 10^4	до 10^4	до 10^5
Золотистый стафилококк	0	0	$10^2 - 10^5$ (у взрослых)
Энтерококки	до 10^6	до 10^4	до $10^5 - 10^6$
Бифидобактерии	$10^9 - 10^{10}$	$10^8 - 10^{10}$	$10^8 - 10^{10}$
Лактобактерии	$10^9 - 10^{10}$	$10^8 - 10^{10}$	$10^7 - 10^{10}$
Грибы рода Кандида	0	до 10^3	до 10^4
Клостридии	0	0	$10^3 - 10^5$ (у взрослых)